

# CIALIS®

tadalafil

## Informação ao Consumidor Medicina

### O que é neste folheto

Este folheto responde a algumas perguntas comuns sobre o Cialis. Não contém todas as informações disponíveis. Não tomar o lugar de falar com o seu médico ou farmacêutico. As informações contidas neste folheto foi actualizado na data indicada na página final. Informações mais recentes sobre este medicamento podem estar disponíveis. Certifique-se de falar com o seu farmacêutico, enfermeiro ou médico para obter o máximo de informações actualizadas sobre este medicamento. Você também pode baixar o mais actualizada folheto de [www.lilly.com.au](http://www.lilly.com.au). O folheto atualizados podem conter informações importantes sobre CIALIS e seu uso que você deve estar ciente. Todos os medicamentos têm riscos e benefícios. O seu médico pesou os riscos de você tomar CIALIS contra os benefícios que eles esperam que terá para você.

**Se você tiver alguma dúvida sobre a tomar este medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.**

**Conserve este folheto com o medicamento.**

Você pode precisar de o ler novamente.

### O Cialis é usado para

Cialis é utilizado para tratar:

- disfunção erétil, também conhecida como impotência, em homens. Isto é, quando um homem não pode obter ou manter um pênis ereto duro adequado para a atividade sexual. Após a estimulação sexual, Cialis funciona por ajudar a

vasos sanguíneos em seu pênis para relaxar, permitindo o fluxo de sangue em seu pênis.

O resultado disto é a melhoria da função erétil. CIALIS só vai tratar a disfunção erétil se você está sexualmente excitado. Você e seu parceiro terá de se envolver em preliminares, tal como faria se estivesse não tomar um medicamento para a disfunção erétil.

- sintomas urinários associados com uma condição comum chamada hiperplasia prostática benigna. Isto é, quando a próstata se torna maior com a idade. Os sintomas incluem dificuldade em começar a urinar, sensação de não esvaziar completamente a bexiga e uma necessidade mais frequente de urinar, mesmo à noite. CIALIS melhora o fluxo sanguíneo para, e relaxa os músculos, o da próstata e bexiga, que pode reduzir os sintomas de hiperplasia prostática benigna. O seu médico pode prescrever-lhe Cialis para tratar quer, ou ambas as condições.

**Pergunte ao seu médico se você tiver quaisquer perguntas sobre o porquê CIALIS foi receitado para si.**

O seu médico pode prescrever-la por outra razão. CIALIS está disponível apenas com receita médica.

Cialis não deve ser utilizado por mulheres ou por crianças com idade inferior a 18 anos.

O ingrediente activo em comprimidos Cialis tadalafil, pertence a um grupo de medicamentos chamados inibidores da fosfodiesterase tipo 5.

### Antes de tomar CIALIS

#### **Quando você não deve tomá-lo**

**Não tome CIALIS se você está actualmente a tomar qualquer nitratos ou nitrito de amila.**

Os nitratos são medicamentos usados para o tratamento de angina ("dor no peito") ou outras doenças cardíacas. Cialis tem sido mostrado para aumentar os efeitos destes medicamentos. Se você estiver tomando qualquer forma de nitrato ou são talk inseguro com o seu médico.

#### **Não tome CIALIS:**

- **se você tem coração ou dos vasos sanguíneos problemas que tornam a relação sexual desaconselhável.**  
A atividade sexual acarreta um possível risco para os pacientes com uma condição de coração, porque coloca pressão extra sobre o coração
- **se você tem problemas cardíacos, tais como angina, arritmias (alterações no ritmo ou taxa de batimento cardíaco), insuficiência cardíaca.**
- **Se você sofreu um ataque cardíaco nos últimos 3 meses**
- **Se você sofreu um acidente vascular cerebral nos últimos 6 meses**
- **Se sua pressão arterial é anormalmente alta ou baixa ou não é um tratamento eficaz**
- **se você tem perda de visão em um olho por causa do interior neuropatia óptica isquêmica não arterítica (NAION)**
- **se você usar drogas recreativas chamadas de "poppers" ou "amilo" como o nitrito de amila e nitrito de butilo que são normalmente tomadas por inalação**

- **se você usa estimuladores guanilato ciclase como riociguat, usado para tratar a hipertensão arterial pulmonar**

**Não tome CIALIS se você tem uma alergia a:**

- qualquer um dos ingredientes listados no final deste folheto

Alguns dos sintomas de uma reação alérgica pode incluir falta de ar, sibilos ou dificuldade respiratória; inchaço da face, lábios, língua ou outras partes do corpo; erupção cutânea, comichão ou urticária na pele.

**Não tome este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem.**

Se ele tiver expirado, devolvê-lo ao seu farmacêutico para a eliminação.

**Não tome este medicamento se a embalagem estiver rasgada ou se os selos sobre as extremidades da caixa estão faltando ou quebrado. Não há vedações ao longo das extremidades do cartão da embalagem de amostra médico 5mg.**

Se ele estiver danificado, devolvê-lo ao seu farmacêutico para a eliminação.

**Se você não tem certeza se você deve começar a tomar CIALIS, fale com o seu médico.**

### **Antes de começar a tomá-lo**

**Diga ao seu médico se você tem alergia a outros medicamentos, alimentos, conservantes ou corantes.**

CIALIS comprimidos contém uma pequena quantidade de lactose.

**Informe o seu médico se você está com 75 anos e mais.**

Você tem uma chance maior de sofrer efeitos colaterais como tonturas e diarreia.

O seu médico irá avaliar se CIALIS é adequado para você.

**Informe o seu médico se você tem ou teve qualquer uma das seguintes condições médicas:**

- problemas de fígado ou rins
- problemas cardíacos ou se você teve um ataque cardíaco
- problemas dos vasos sanguíneos

- anemia das células falciformes (uma anormalidade de células vermelhas do sangue)
- mieloma múltiplo (câncer da medula óssea)
- leucemia (câncer das células do sangue)
- qualquer deformação do pênis (tais como angulação, fibrose cavernosa ou doença de Peyronie)
- perda da visão em um ou ambos os olhos

**Se você não tiver informado o seu médico ou farmacêutico sobre qualquer um dos acima, dizer-lhes antes de tomar Cialis.**

### **Ao tomar outros medicamentos**

**Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar outros medicamentos, incluindo qualquer que você começa sem uma prescrição de seu farmácia, supermercado ou a saúde alimentar loja.**

Alguns medicamentos podem ser afetados por CIALIS ou pode afetar a forma como ele funciona.

Esses incluem:

- Nitratos, medicina, tais como trinitrato de glicerilo, mononitrato de isossorbida e nitroprussiato de sódio utilizada para tratar a angina e outras doenças do coração
- Alguns medicamentos antibióticos tais como a rifampicina, eritromicina e claritromicina
- Alguns medicamentos usados no tratamento de convulsões, tais como fenitoína, fenobarbital e carbamazepina
- Alguns medicamentos utilizados no tratamento de infecções fúngicas, tais como o cetoconazol e o itraconazol
- Os inibidores da protease utilizados para tratar o HIV como ritonavir e saquinavir
- Medicamentos utilizados no tratamento da hipertensão (pressão arterial elevada), tais como metoprolol, o irbesartan e o enalapril
- bloqueadores alfa (utilizados para tratar a hipertensão e alguns problemas da próstata), tais como prazosina e doxazosina

- Um inibidor da 5-alfa redutase, tal como finasteride (utilizado para tratar os problemas da próstata e da perda de cabelo)
- Varfarina, um medicamento utilizado para prevenir ou tratar coágulos sanguíneos

• **Altas doses de álcool**

• **Suco de toranja**

- Outros inibidores de PDE5, tais como sildenafil usado para tratar a disfunção erétil ou hipertensão arterial pulmonar (pressão sanguínea elevada nos vasos sanguíneos nos pulmões)
- estimuladores da guanilato ciclase, tais como riociguat, utilizados para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar. Estes medicamentos podem ser afetados por CIALIS ou pode afetar a forma como ele funciona. Você pode precisar de quantidades diferentes de seus medicamentos ou você pode precisar de tomar medicamentos diferentes.

**Você não deve tomar Cialis juntamente com quaisquer outros tratamentos para a disfunção erétil.**

O seu médico e farmacêutico tem mais informações sobre medicamentos que ter cuidado com ou evitar enquanto tomar este medicamento.

---

## **Como tomar CIALIS**

---

**Siga todas as instruções dadas pelo seu médico ou farmacêutico cuidado.**

Eles podem diferir da informação contida neste folheto.

### **Para a disfunção erétil**

Cialis pode ser tomado como qualquer dosagem on-demand ou dosagem uma vez por dia. CIALIS on-demand (10 mg e 20 mg) é destinado a ser utilizado antes da actividade sexual prevista e não é para uso diário contínuo. Cialis-a-dia (5 mg) é para os pacientes que prevêem o uso frequente de CIALIS (isto é, pelo menos, duas vezes por semana). Seu médico pode aconselhar sobre a adequação do tratamento uma vez por dia. Quando tomado uma vez por dia, Cialis permite obter uma ereção, quando sexualmente estimulado, em nenhum momento durante as 24 horas de

o dia. Não tome uma vez por dia dosagem e on-demand dosagem simultaneamente.

Ao tomar CIALIS uma vez por dia (5 mg), pode levar até uma semana para um efeito completo sobre Disfunção Eréctil.

#### **Para os sintomas urinários associados com hiperplasia da próstata benigna**

Cialis-a-dia (5 mg) é tomado diariamente. Para sintomas urinários associados com hiperplasia benigna da próstata pode levar até uma semana para observar uma melhoria e 1 mês para um efeito completo sobre sintomas urinários, tais como; urinar com muita frequência durante o dia ou à noite, a necessidade de urinar ser muito urgente, ou muito pouco depois de aliviar a bexiga. CIALIS deve ser tomada diariamente para manter o efeito.

**Se você não entender as instruções na embalagem, pergunte ao seu médico ou farmacêutico para obter ajuda.**

#### **Quanto tomar**

**Não deve tomar CIALIS mais do que uma vez por dia.**

Sempre tomar Cialis exactamente como o seu médico lhe disse. Verifique com o seu médico ou farmacêutico se você não tem certeza.

#### **ON-DEMAND DOSAGEM para a disfunção eréctil**

A dose máxima recomendada de CIALIS é um comprimido de 20 mg tomado antes da actividade sexual.

Se você tem doença renal, a dose recomendada de CIALIS é um comprimido de 10 mg. Esta dose pode ser aumentada até 20 mg. Para pacientes com grave insuficiência renal é de 10 mg a dose máxima recomendada. Se tiver doença hepática, a dose recomendada de CIALIS é de um comprimido de 10 mg. Doentes com insuficiência hepática grave devem seguir o conselho de seu médico.

Nenhuma consideração especial dosagem é necessário para idosos ou pessoas com diabetes.

#### **Dosagem de uma vez-A-DIA para a disfunção erétil e / ou sintomas urinários**

#### **Associada à hiperplasia benigna da próstata**

A dose recomendada de CIALIS é um comprimido de 5 mg tomado uma vez por dia. ajustes de dose não são necessários em pacientes com doença renal, a menos que você tem insuficiência renal grave. Uma vez por dia dosagem de Cialis não é recomendado em doentes com insuficiência renal grave.

Os pacientes com doença hepática deve seguir o conselho de seu médico. dosagem única aday de Cialis não é recomendado em doentes com insuficiência hepática grave. Nenhuma consideração especial dosagem é necessário para idosos ou pessoas com diabetes.

#### **Como levá-la**

**Engolir um comprimido inteiro com um copo cheio de água.**

#### **Ao levá-la**

Cialis pode ser tomado com ou sem alimentos ou álcool. No entanto, o consumo de álcool pode afetar sua capacidade de obter uma ereção, portanto, evite o excesso de bebida.

#### **ON-DEMAND DOSAGEM para o Cialis DISFUNÇÃO ERÉCTIL (10 mg ou 20 mg) deve ser feita, pelo menos de 30-60 minutos antes da actividade sexual prevista.**

A quantidade de tempo CIALIS demora a actuar varia de pessoa para pessoa. Em alguns homens Cialis pode trabalhar tão cedo quanto 16 minutos após a toma do comprimido, mas é recomendável que você permitir que uma hora a primeira vez que você levá-la. Cialis tem sido provado ser eficaz por até 36 horas. Isto significa que você pode tomar Cialis e vai permitir-lhe obter uma ereção quando sexualmente estimulado, a qualquer momento durante as 36 horas após tomá-lo. Às vezes, se você está se sentindo ansioso ou nervoso você pode não responder ao primeiro tablet. Não desista, pode levar algumas doses antes de obter todos os benefícios de Cialis.

#### **UMA VEZ-A-DIA DE DOSAGEM para a disfunção erétil e / ou sintomas urinários associados com hiperplasia benigna da próstata**

Cialis 5 mg deve ser tomada por dia aproximadamente à mesma hora do dia. CIALIS deve ser tomada diariamente para manter o efeito.

**Se você tem dúvidas sobre tomar CIALIS, pergunte ao seu médico ou farmacêutico.**

#### **Se você tomar demais (overdose)**

**telefone imediatamente o seu médico ou os venenos Centro de Informações australiano (telefone 13 11 26) ou a Nova Zelândia National Poisons Center (0800 POISON ou 0800 764 766), ou ir para Acidentes e Emergência do hospital mais próximo, se você acha que você ou alguém pode ter tomado uma dose Cialis.**

Faça isso mesmo se não houver sinais de desconforto ou envenenamento. Você pode precisar de cuidados médicos urgentes. Os sintomas de uma sobredosagem podem incluir dor de cabeça, dispepsia (indigestão), dor nas costas, dores musculares, congestão nasal e rubor facial.

---

#### **Enquanto estiver a tomar CIALIS**

---

##### ***Coisas que você deve fazer***

**Se você tem um tratamento de emergência para qualquer condição cardíaca suspeita informe o pessoal médico ou de ambulância de emergência que está a tomar Cialis. Se você está prestes a ser iniciado em qualquer novo medicamento, lembre seu médico e farmacêutico que está a tomar Cialis. Diga quaisquer outros médicos, dentistas e farmacêuticos que tratá-lo que está a tomar Cialis.**

### ***Coisas que você não deve fazer***

**Não tome CIALIS para tratar quaisquer outras queixas menos que seu médico lhe diga.**

**Não dê o seu medicamento a qualquer pessoa, mesmo que tenham a mesma condição como você.**

### ***Coisas para ter cuidado com***

**Seja condução cuidadosa ou operar máquinas até saber como CIALIS afecta.**

---

## **Efeitos colaterais**

**Informe o seu médico ou farmacêutico o mais rapidamente possível se você não se sentir bem enquanto estiver a tomar Cialis.**

CIALIS ajuda a maioria das pessoas com disfunção erétil ou sintomas urinários associados com hiperplasia prostática benigna, mas que pode ter efeitos colaterais indesejados em algumas pessoas. Todos os medicamentos podem ter efeitos secundários.

Às vezes, eles são graves, na maioria das vezes eles não são. Você pode precisar de atenção médica se você receber alguns dos efeitos colaterais.

**Não se assuste pela seguinte lista de possíveis efeitos colaterais. Você não pode experimentar qualquer um deles. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para responder a quaisquer perguntas que você possa ter.**

Os seguintes efeitos secundários são geralmente ligeiros e de curta duração.

**Informe o seu médico ou farmacêutico se você notar qualquer um dos seguintes e eles se preocupe, você:**

- rubor facial
- indigestão
- dor no peito
- aumento da batida de coração
- dor nas costas
- dores musculares, incluindo dor nos braços e pernas
- dor de estômago
- diarreia

- azia
- reações alérgicas, incluindo prurido da pele, inchaço da cara e urticária
- sudorese
- cefaleia ou enxaqueca
- congestão nasal
- tonturas
- desmaios
- infecção
- dor de garganta e desconforto ao engolir
- olhos vermelhos, dor nos olhos e inchaço das pálpebras são incomuns
- alterações na visão de cores são raras
- diminui ou perda de visão são muito raros
- visão embaçada
- nariz sangrando
- erecção prolongada

**Se você sentir dor no peito durante ou após a atividade sexual, pare o que está fazendo, sentar-se e sentar-se para a frente.**

**Chame uma ambulância se a dor não resolver. Não utilize nitratos.**

Em casos raros é possível que uma erecção prolongada e possivelmente dolorosa pode ocorrer depois de tomar Cialis.

**Se você tiver uma erecção que dura mais de 4 horas, deve contactar um médico imediatamente.**

Ao tomar CIALIS com grandes quantidades de álcool, alguns homens podem sentir tonturas, súbita perda ou diminuição da audição, que pode ser acompanhada de zumbido nos ouvidos e tonturas, perda de visão em um ou ambos os olhos e apreensões foram relatados em pessoas que tomam Cialis. Não é possível determinar se estes eventos estão relacionados diretamente a CIALIS, a outras doenças ou medicamentos, a outros fatores, ou a uma combinação de fatores. Se tiver estes sintomas, pare de tomar Cialis e contactar um médico imediatamente.

Esta não é uma lista completa de todos os efeitos secundários possíveis. Outros podem ocorrer em algumas pessoas e pode haver efeitos colaterais ainda não conhecidos. não foram examinados os efeitos de abstinência potenciais de uso diário. Recomenda-se que os doentes continuem a ser monitorado pelo seu médico após a descontinuação do Cialis.

**Se você notar qualquer sintoma que o preocupe, verifique com seu médico. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico se você não entender nada sobre esta lista.**

---

## **Depois de tomar CIALIS**

### ***Armazenamento***

**Mantenha os comprimidos na embalagem original até a hora de levá-los.**

Se você tomar os comprimidos fora do bloco não podem manter bem.

**Mantenha seus comprimidos em um lugar fresco e seco, onde a temperatura fica abaixo de 25 ° C. Não guarde CIALIS ou qualquer outro medicamento na casa de banho ou perto de uma pia. Não deixá-lo no parapeito de uma janela ou no carro.**

Calor e umidade podem destruir alguns medicamentos.

**Mantenha o seu medicamento, onde as crianças não conseguem alcançar.**

Um armário fechado metros pelo menos um anda meio acima do solo é um bom lugar para armazenar medicamentos.

### ***Disposição***

**Se o seu médico lhe diga para parar de tomar este medicamento ou a data de validade já passou, pergunte ao seu farmacêutico o que fazer com qualquer medicamento que sobra.**

---

## Descrição do Produto

---

### *O que isso parece*

CIALIS 5 mg comprimidos são revestidos com um filme amarelo, em forma de amêndoa, comprimidos, marcado "C5" de um lado. CIALIS 10 mg comprimidos são luz amarela revestidos com um filme, em forma de amêndoa, comprimidos, marcado como "C10" de um lado. CIALIS 20 mg comprimidos são revestidos com um filme amarelo, em forma de amêndoa, comprimidos, marcado como "C20" de um lado.

### *ingredientes*

#### **Ingredientes ativos**

- Comprimido de 5 mg - 5 mg de tadalafil
- Comprimido de 10 mg - 10 mg de tadalafil
- Comprimido de 20 mg - 20 mg de tadalafil

#### **Outros ingredientes**

- croscarmelose de sódio
- hidroxipropilcelulose
- hipromelose
- óxido de ferro amarelo CI77492
- lactose
- estearato de magnésio
- celulose - microcristalina
- lauril sulfato de sódio
- talco - purificado
- dióxido de titânio
- triacetato de glicerol (triacetina) Este

medicamento não contém sacarose, glúten, tartrazina ou quaisquer outros corantes azo.