

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Levitra 20 comprimidos revestidos por película mg
vardenafil

Leia este folheto antes de utilizar este medicamento.

- Conserve este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Se você tiver alguma dúvida, pergunte ao seu médico ou farmacêutico.
- Esse remédio foi receitado para você. Não dá-lo a outros. Ser-lhes prejudicial, mesmo que os sintomas são os mesmos que o seu.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O Levitra é e para que é utilizado para
2. Antes de tomar Levitra
3. Como tomar Levitra
4. Os possíveis efeitos secundários
5. Como armazenar Levitra
6. Outras informações

1. O QUE É LEVITRA E PARA QUE É UTILIZADO

Levitra pertence a um grupo de medicamentos que são utilizados para o tratamento de dificuldades em obter ou manter uma erecção (disfunção erétil).

Cerca de dificuldades de ereção

Pelo menos um em cada dez homens tem dificuldade para obter ou manter uma ereção em algum momento. Pode haver causas físicas ou psicológicas, ou uma mistura de ambos. Seja qual for a causa, devido à musculares e vasos sanguíneos mudanças não suficientes estadias de sangue no pênis para torná-lo duro e mantê-lo duro.

obras como Levitra

Levitra apenas funcionará quando for sexualmente estimulado. Ele reduz a ação da substância química natural em seu corpo que faz com que as ereções ir embora. LEVITRA permite a ereção dure o tempo suficiente para que a atividade sexual satisfatória completa.

2. ANTES DE TOMAR LEVITRA Não tome

Levitra

- Se tem alergia (hipersensibilidade) ao vardenafil ou a qualquer outro componente de Levitra. Ver os ingredientes na secção 6. Os sinais de uma reacção alérgica incluem erupções cutâneas, comichão, inchaço da cara ou lábios e falta de ar.
- Se estiver a tomar medicamentos que contenham nitratos, tais como trinitrato de glicerol para a angina, ou dadores de óxido nítrico, tal como o nitrito de amilo. A utilização destes medicamentos com Levitra pode afectar seriamente a sua pressão arterial.
- Se estiver a tomar ritonavir ou indinavir, medicamentos para o HIV.
- Se tiver mais de 75 anos de idade e está a tomar cetoconazol ou itraconazol, medicamentos anti-fúngicos
- Se você tiver um problema cardíaco ou hepática grave
- Se você está tendo diálise renal
- Se você tem tido recentemente um derrame ou ataque cardíaco
- Se você tem ou teve pressão sanguínea baixa
- Se a sua família tem um histórico de doenças degenerativas dos olhos (tais como *retinite pigmentosa*)
- Se você já teve uma condição que envolve perda de visão devido a danos no nervo óptico de fornecimento insuficiente de sangue conhecida como neuropatia óptica isquêmica não arterítica (NAION)

Tome especial cuidado com Levitra

Se você tem problemas cardíacos. Pode ser arriscado para você fazer sexo

Se você sofre de batimento irregular do coração (arritmia cardíaca) ou de doenças cardíacas hereditárias que afectam o seu eletrocardiograma

Se você tiver uma condição que afecte a forma do pênis. Isto inclui situações chamadas

angulação, doença de Peyronie e fibrose cavernosa

Se você tem uma doença que possa causar ereções que não desaparecem (*priapismo*). Esses incluem

a doença das células falciformes, mieloma múltiplo e leucemia

Se você tem úlceras de estômago (também chamado *gástrico* ou *péptico* úlceras) Se você tem um

distúrbio hemorrágico (tal como *hemofilia*)

Se você estiver usando qualquer outros tratamentos para a dificuldades erécteis

Se teve diminuição ou perda de visão súbita, pare de tomar Levitra e contacte o seu médico imediatamente.

Levitra é para os homens de 18 anos ou mais

Não se destina para uso por mulheres, crianças ou homens menores de 18 anos.

Ao utilizar outros medicamentos

Por favor, informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar ou tiver utilizado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica

Levitra pode geralmente ser tomado com a maioria dos medicamentos. Mas alguns podem causar problemas, especialmente estes:

Nitratos, medicamentos para a angina, ou dadores de óxido nítrico, tal como o nitrito de amilo. A utilização destes medicamentos com Levitra pode afectar seriamente a sua pressão arterial. ***Fale com o seu médico sem tomar Levitra***

Medicamento para o tratamento de arritmias, tais como quinidina, procainamida, amiodarona ou sotalol

medicamentos ritonavir ou indinavir, para o HIV. *Fale com o seu médico sem tomar Levitra*

Cetoconazole ou itraconazole, medicamentos anti-fúngicos A eritromicina

ou claritromicina, antibióticos macrólidos

Alfa-bloqueadores, um tipo de medicamento utilizado para tratar a pressão sanguínea elevada e o alargamento da próstata (tal como hiperplasia benigna da próstata)

Tomar Levitra com alimentos e bebidas

Você pode tomar Levitra com ou sem alimentos - mas preferencialmente não após uma refeição pesada ou alto teor de gordura, pois isso pode atrasar o efeito.

Não beba sumo de toranja ao tomar Levitra. Ele pode interferir com o efeito do habitual remédio.

Bebida alcoólica pode fazer dificuldades de ereção pior.

A gravidez e o aleitamento

Levitra não é para ser usado por mulheres.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Levitra pode fazer algumas pessoas sentem tonturas ou afectar a visão. Se sentir tonturas ou se a visão é afectada depois de tomar Levitra não conduzir ou utilizar quaisquer ferramentas ou máquinas.

3. COMO TOMAR LEVITRA

Sempre tomar Levitra exactamente como o seu médico lhe disse. Você deve verificar com o seu médico ou farmacêutico se você não tem certeza. A dose habitual é de 10 mg.

Tomar um comprimido Levitra cerca de 25 a 60 minutos antes da actividade sexual. Com estimulação sexual poderá conseguir uma ereção em qualquer lugar de 25 minutos até quatro a cinco horas após tomar Levitra.

Engolir um comprimido com um copo de água Não utilize

Levitra mais que uma vez por dia.

Informe o médico se você acha que Levitra é demasiado forte ou demasiado fraco. Ele ou ela pode sugerir uma dose diferente, dependendo de quão bem ele funciona para você.

Se tomar mais Levitra do que deveria

Homens que tomam muito Levitra pode experimentar mais efeitos colaterais ou pode ter graves dores nas costas. Se tomar mais Levitra do que deveria, informe o seu médico.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, Levitra pode causar efeitos secundários, embora nem todas as pessoas. A maioria dos efeitos são ligeiros ou moderados. A possibilidade de ter um efeito colateral é descrita pelas seguintes categorias:

Muito comum (afecta mais do que um utilizador em 10)

Dor de cabeça

Flushing

comum (afectam 1 a 10 utilizadores em cada 100)

doente indigestão Sentimento (náusea)

Tontura

Bloqueado ou corrimento nasal

Pouco frequentes (afecta 1 a 10 utilizadores em 1.000)

Sensibilidade da pele à pressão luz solar
arterial alta ou baixa Voltar ou Efeitos dor
muscular na visão Bloodshot ou olhos
lacrimejantes Sonolência Rash

Efeito nos resultados dos testes ao sangue para verificar fígado função aumento no
sangue de uma enzima muscular (creatina fosfoquinase) Dispneia

batimento cardíaco rápido ou latejante Nose
coração sangra inchaço Facial

raros (afecta 1 a 10 utilizadores em cada 10.000)

desmaio
rigidez muscular
Aumentar a pressão no olho (glaucoma) erecções
prolongadas ou dolorosas reacção alérgica

Efeitos sobre o coração tais como angina () Ansiedade

Inchaço dentro da garganta
perda temporária de memória (tal como amnésia global transitória) Apreensão

diminuição ou perda de visão em um ou ambos os olhos parcial, súbita, temporária ou permanente tem sido experimentado pelos pacientes.

diminuição ou perda súbita da audição foi relatada.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico.

5. COMO CONSERVAR LEVITRA

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não use Levitra após a data de validade impresso na embalagem exterior. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o meio ambiente.

6. INFORMAÇÕES Qual Levitra contém

- A substância activa é vardenafil. Cada comprimido contém 20 mg de vardenafil (como tri-hidrato de cloridrato).
- Os outros ingredientes dos comprimidos são os seguintes:
Núcleo do comprimido: crospovidona, estearato de magnésio, celulose microcristalina, sílica coloidal anidra.

Película de revestimento: macrogol 400, hipromelose, dióxido de titio (E171), amarelo de óxido de ferro (E172), óxido de ferro vermelho (E172).

O aspecto de Levitra e conteúdo da embalagem

Levitra 20 mg, comprimidos revestidos por película são de cor laranja com o símbolo BAYER num dos lados e a dosagem (20) no outro lado. Os comprimidos são fornecidos em embalagens de blisters contendo 2, 4, 8 ou 12 comprimidos. Nem todos os tamanhos de embalagem podem ser comercializados.

Titular da Autorização e Fabricante

Titular de AIM: Bayer Schering Pharma AG, 13342 Berlim, Alemanha. Fabricante: Bayer Schering Pharma

AG, 51368 Leverkusen, Alemanha.

Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do titular da AIM.

België / Belgique / Belgien

Bayer SA / NV
TEL / Tel: + 32 (0) 2-535 63 11

Luxemburgo / Luxemburgo

Bayer SA / NV
TEL / Tel: + 32 (0) 2-535 63 11

България

Байер България ЕООД
Тел .: +359 02 81 401 01

Magyarország

Bayer Hungária Kft.
Tel .: + 36-1-487-4100

Danmark

GlaxoSmithKline sro
Tel: +420 2 22001111

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.
Tel: + 356-21 44 62 05

Danmark

Bayer A / S
Tlf: + 45-45-23 50 00

Nederland

Bayer BV, Bayer Schering Pharma
Tel: + 31- (0) 297-28 06 66

Deutschland

Bayer Vital GmbH
Tel: + 49- (0) 214-30 513 48

Norge

Bayer AS
Tlf: +47 24 11 18 00

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Tel: +372 6676900
Estonia@GSK.com

Österreich

Bayer Austria Ges. mb H.
Tel: + 43- (0) 1-711 46-0

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ABEE
Τηλ: 30 210 618 75 00

Polska

Bayer Sp. z oo
Tel .: + 48-22-572 35 00

España

Química Farmacéutica Bayer SL
Tel: + 34-93-495 65 00

Portugal

Bayer Portugal SA
Tel: + 351-21-416 42 00

França

Bayer Santé
Tel: + 33-3 - 20 20 80 80

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL
Tel: + 4021 3028 208

Irlanda

Bayer limitada
Tel: +353 1 299 93 13

Ilha

hf Vistor.
Fone: +354 535 70 00

Italia

Bayer SpA Tel: +
39-02-397 81

Κύπρος

NOVAGEM limitada
Τηλ: + 357 22 74 77 47

Latvija

GlaxoSmithKline Letónia SIA
Tel: + 371-67312687

Lietuva

UAB "GlaxoSmithKline Lietuva" Tel: +370 5
264 90 00

Slovenija

Bayer doo
Tel: + 386 1 58 14 400

republika Slovenská

GlaxoSmithKline Slovakia sro
Tel: + 421 (0) 2 48261111

Suomi / Finland

Bayer Oy, Bayer Schering Pharma
Puh / Tel: + 358-20 785 21

Sverige

Bayer AB
Tel: + 46- (0) 223 00 8-580

Reino Unido

Bayer plc
Tel: + 44- (0) 1 635-563000