

VIAGRA®

25 mg, 50 mg ou 100 comprimidos revestidos por película mg
sildenafil

Folheto informativo: Informação para o doente

Leia este folheto antes de tomar este medicamento, pois contém informações importantes para si.

- Conserve este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Se você tiver alguma dúvida, pergunte ao seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
- Este medicamento foi receitado para si. Não dá-lo a outros. Pode ser-lhes prejudicial mesmo que seus sinais da doença são os mesmos que o seu.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isto inclui quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto. Ver secção 4.

O que é neste folheto

1. O Viagra é e para que é utilizado para
2. O que você precisa saber antes de tomar VIAGRA
3. Como tomar VIAGRA
4. Os possíveis efeitos secundários
5. Como armazenar VIAGRA
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que VIAGRA é e para que é utilizado para

VIAGRA contém o sildenafil substância activa que pertence a um grupo de medicamentos designados fosfodiesterase tipo 5 (PDE 5) inibidores. Ela funciona por ajudar a relaxar os vasos sanguíneos em seu pênis, permitindo que o sangue flua para o seu pênis quando você começa sexualmente animado. VIAGRA só irá ajudá-lo a obter uma erecção se for sexualmente estimulado.

VIAGRA é um tratamento para homens adultos com disfunção erétil, por vezes conhecida como a impotência. Isto é, quando um homem não pode obter ou manter um duro, pênis ereto adequados para a atividade sexual.

2. O que você precisa saber antes de tomar VIAGRA Não tome

VIAGRA

- Se você é alérgico ao sildenafil ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- - Se estiver a tomar medicamentos chamados nitratos, pois a combinação pode levar a uma queda perigosa na sua pressão arterial. Informe o seu médico se estiver a tomar qualquer um destes medicamentos que são muitas vezes utilizados para o alívio da angina de peito (ou "dor no peito"). Se você não tiver certeza, pergunte ao seu médico ou farmacêutico.
- - Se você estiver usando qualquer um dos medicamentos conhecidos como dadores de óxido nítrico, tal como o nitrato de amila ("poppers"), como a combinação também podem levar a uma queda perigosa na sua pressão arterial.
- Se você está tomando riociguat. Esta droga é usada para tratar a hipertensão arterial pulmonar (isto é, pressão sanguínea elevada nos pulmões) e hipertensão pulmonar tromboembólica crónica (ou seja, alta

pressão arterial nos pulmões secundárias para a formação de coágulos sanguíneos). inibidores de PDE5, tais como Viagra ter sido demonstrado que o aumento dos efeitos hipotensores de este medicamento. Se você está tomando riociguat ou não tiver certeza informe o seu médico.

- Se você tiver um problema cardíaco ou hepática grave.
- Se você tem tido recentemente um acidente vascular cerebral ou um ataque cardíaco, ou se você tem pressão arterial baixa.
- Se você tem determinadas doenças oculares hereditárias (tal como *retinite pigmentosa*).
- Se você alguma vez teve perda de visão devido a neuropatia não arterítica óptica isquêmica anterior (NOIA).

Avisos e Precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar VIAGRA

- Se você tem anemia falciforme (uma anomalia nos glóbulos vermelhos), leucemia (cancro das células do sangue), mieloma múltiplo (cancro da medula óssea).
- Se você tem uma deformação do pênis ou doença de Peyronie.
- Se você tiver problemas com o seu coração. O seu médico deve verificar cuidadosamente se o seu coração pode tomar a tensão adicional de ter sexo.
- Se você atualmente tem uma úlcera de estômago ou um problema hemorrágico (tal como a hemofilia).
- Se teve diminuição ou perda de visão súbita, pare de tomar VIAGRA e contacte o seu médico imediatamente.

Você não deve usar VIAGRA com quaisquer outros tratamentos orais ou locais para a disfunção erétil.

Não deve utilizar VIAGRA com tratamentos para a hipertensão arterial pulmonar (HAP) contendo o sildenafil ou quaisquer outros inibidores de PDE5.

Não deve tomar VIAGRA se você não tiver disfunção erétil. Não deve tomar

VIAGRA se você é uma mulher.

Considerações especiais para pacientes com problemas renais ou hepáticos

Deve informar o seu médico se você tem problemas renais ou hepáticos. O seu médico pode decidir sobre uma dose mais baixa para você.

Crianças e adolescentes

VIAGRA não deve ser administrado a pessoas com idade inferior a 18.

Outros medicamentos e VIAGRA

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

comprimidos de Viagra pode interferir com alguns medicamentos, especialmente aqueles utilizados para tratar a dor no peito. Em caso de uma emergência médica, deve informar o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro que você tenha tomado

VIAGRA e quando o fez. Não tome VIAGRA com outros medicamentos, a menos que o seu médico lhe diz que você pode.

Não deve tomar VIAGRA se estiver a tomar medicamentos chamados nitratos, pois a combinação destes medicamentos pode levar a uma queda perigosa na sua pressão arterial. Sempre informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar qualquer um destes medicamentos que são frequentemente utilizados para o alívio da angina de peito (ou "dor no peito").

Não deve tomar VIAGRA se você estiver usando qualquer um dos medicamentos conhecidos como dadores de óxido nítrico, tais como nitrito de amilo ("poppers") como a combinação também podem levar a uma queda perigosa na sua pressão arterial.

Informe o seu médico ou farmacêutico se você já está tomando riociguat.

Se estiver a tomar medicamentos conhecidos como inibidores de proteases, tais como para o tratamento do HIV, o médico pode começar na dose mais baixa (25 mg) do VIAGRA.

Alguns pacientes que tomam terapia de alfa-bloqueadores para o tratamento de pressão alta de sangue ou aumento da próstata podem sentir tonturas ou tonturas, que pode ser causada por uma pressão arterial baixa quando sentado ou em pé para cima rapidamente. Alguns doentes tiveram estes sintomas quando tomaram VIAGRA com bloqueadores alfa. Esta é mais provável de acontecer dentro de 4 horas após tomar Viagra. Para reduzir a chance de que esses sintomas pode acontecer, você deve estar em uma dose diária regular do seu bloqueador alfa antes de começar VIAGRA. O seu médico pode recomendar que comece com uma dose mais baixa (25 mg) de VIAGRA.

VIAGRA com alimentos e bebidas e álcool

VIAGRA pode ser tomado com ou sem alimentos. No entanto, você pode achar que VIAGRA demora mais tempo para começar a trabalhar se você tomá-lo com uma refeição pesada.

Beber álcool pode impedir temporariamente a capacidade de obter uma ereção. Para obter o máximo benefício do seu medicamento, que são aconselhados a não beber quantidades excessivas de álcool antes de tomar Viagra.

Gravidez, amamentação e fertilidade

VIAGRA não está indicado para utilização por mulheres.

Condução de veículos e utilização de máquinas

VIAGRA pode causar tonturas e pode afetar a visão. Você deve estar ciente de como você reage ao VIAGRA antes de conduzir ou utilizar máquinas.

VIAGRA contém lactose

Se lhe foi dito pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, tais como lactose, contacte o seu médico antes de tomar Viagra.

3. Como tomar VIAGRA

Tome sempre este medicamento exactamente como o seu médico ou farmacêutico lhe disse. Verifique com o seu médico ou farmacêutico se você não tem certeza. A dose inicial recomendada é de 50 mg.

Não deve tomar VIAGRA mais do que uma vez por dia.

Não tome VIAGRA comprimidos revestidos por película em combinação com o Viagra comprimido orodispersível. Você deve tomar VIAGRA cerca de uma hora antes que você pretende ter relações sexuais. Engolir o comprimido inteiro com um copo de água.

Se você sentir que o efeito do Viagra é muito forte ou muito fraco, fale com o seu médico ou farmacêutico. VIAGRA só irá ajudá-lo a obter uma ereção se for sexualmente estimulado. A quantidade de tempo VIAGRA demora a actuar varia de pessoa para pessoa, mas normalmente leva entre meia hora e uma hora. Você pode achar que VIAGRA demora mais tempo a actuar se for tomado com uma refeição pesada. Se VIAGRA não ajudá-lo a obter uma ereção ou se a ereção não durar o suficiente para que você possa completar a relação sexual, deverá informar o seu médico.

Se tomar mais VIAGRA do que deveria:

Você pode experimentar um aumento dos efeitos secundários e da sua gravidade. As doses acima de 100 mg de não aumentar a eficácia.

Não deve tomar mais comprimidos do que o seu médico lhe diga.

Contacte o seu médico se você tomar mais comprimidos do que deveria.

Se você tiver dúvidas sobre o uso deste medicamento, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

4. Os possíveis efeitos secundários

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora nem todo mundo recebe-los. Os efeitos colaterais reportados em associação com a utilização de VIAGRA são geralmente ligeira a moderada e de uma curta duração.

Se você sentir algum dos seguintes efeitos secundários graves parar de tomar Viagra e procurar ajuda médica imediatamente:

- **Uma reacção alérgica ocorre -este pouco frequentes (podem afectar até 1 em 100 pessoas)** Os sintomas incluem asma súbita, dificuldade em respirar ou tonturas, inchaço das pálpebras, face, lábios ou garganta.

- **Peito pains- isso ocorre *invulgarmente***

Se isto ocorrer durante ou após o acto sexual

-Entre em uma posição semi-sentada e tente relaxar.

-Não utilize nitratos para tratar a sua dor no peito.

- **Prolongada e ereções dolorosas, por vezes - isso ocorre *raramente* (podem afectar até 1 em cada 1.000 pessoas).** Se você tiver uma ereção que dura mais de 4 horas, deve contactar um médico imediatamente.

- **A diminuição ou perda de visão: isto ocorre súbita *raramente***

- **cutâneas graves reactions- isso ocorre *raramente***

Os sintomas podem incluir grave descamação e inchaço da pele, bolhas da boca, órgãos genitais e em torno dos olhos, febre.

- **Convulsões ou fits- isso ocorre *raramente* Outros**

efeitos secundários:

Muito comum (podem afectar mais de 1 em cada 10 pessoas): dor de cabeça.

comum (podem afectar até 1 em cada 10 pessoas): náuseas, rubor facial, afrontamentos (os sintomas incluem uma súbita sensação de calor em sua parte superior do corpo), indigestão, tinge de cor para a visão, visão turva, distúrbios visuais, nariz entupido e tonturas.

Pouco frequentes (podem afectar até 1 em cada 100 pessoas): vômitos, erupções cutâneas, irritação ocular, olhos vermelhos / olhos vermelhos, dor nos olhos, vendo flashes de luz, o brilho visual, sensibilidade à luz, olhos lacrimejantes, batimento cardíaco acelerado, taquicardia, pressão arterial elevada , baixa pressão arterial, dor muscular, sonolência reduzida sentido do tato, vertigem, zumbido nos ouvidos, boca, bloqueados ou entupido seios, secos inflamação da mucosa do nariz (sintomas incluem corrimento nasal, espirros e nariz entupido), dor abdominal superior, doença do refluxo gastro-esofágico (sintomas incluem azia),, a presença de sangue na urina, dor nos braços e pernas, sangramento do nariz, sensação de calor e sensação de cansaço.

raros (podem afectar até 1 em cada 1.000 pessoas): desmaios, derrame, ataque cardíaco, batimentos cardíacos irregulares, temporária diminuição do fluxo de sangue para partes do cérebro, sensação de aperto na garganta, boca entorpecida, sangramento na parte de trás do olho, visão dupla , redução da acuidade visual, sensação anormal no olho, inchaço do olho ou da pálpebra, pequenas partículas ou manchas na sua visão, vendo halos ao redor das luzes, dilatação da pupila do olho, descoloração do branco do olho, sangramento peniana , a presença de sangue no sémen, nariz seco, inchaço do interior do nariz, sentindo diminuição irritável e ou perda súbita de audição.

De pós-comercialização casos de experiência de angina instável (uma condição cardíaca) e morte súbita têm sido raramente relatadas. De nota maioria, mas não todos, os homens que experimentaram estes efeitos secundários teve problemas cardíacos antes de tomar este medicamento. Não é possível determinar se estes eventos estavam directamente relacionados com o Viagra.

Relatórios de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isto inclui quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto. Você também pode denunciar efeitos colaterais directamente (ver detalhes abaixo). Ao relatar efeitos secundários que podem ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança do medicamento.

5. Como conservar VIAGRA

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças. Não conservar

acima de 30°C.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade indicado na embalagem e no blister após EXP. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês.

Conservar na embalagem original, de modo a proteger da humidade.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas irão ajudar a proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O VIAGRA contém

- A substância activa é o sildenafil. Cada comprimido contém 25 mg, 50 mg ou 100 mg de sildenafil (como o sal citrato).
- Os outros ingredientes são:
 - Núcleo do comprimido: celulose microcristalina, hidrogenofosfato de cálcio (anidro), croscarmelose de sódio, estearato de magnésio
 - Película de revestimento: hipromelose, dióxido de titio (E 171), mono-hidrato de lactose, triacetina, índigo carmim laca de alumínio (E132)

O VIAGRA e conteúdo da embalagem

VIAGRA comprimidos revestidos por película são azuis, com uma forma de diamante arredondado. Eles são marcados "Pfizer" de um lado e "VGR 25", "VGR 50" ou "VGR 100" sobre o outro lado. Os comprimidos são fornecidos em embalagens de blisters contendo 2, 4, 8, 12 ou 24 comprimidos. Algumas embalagens não podem ser comercializadas no seu país.

Titular da Autorização e Fabricante

O titular de VIAGRA autorização de comercialização é a Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Reino Unido.

O fabricante do Viagra é Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, França.

Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do titular da AIM:

Irlanda

Pfizer Saúde Irlanda Tel: 1800 633
363 (ligação gratuita) Tel: +44 (0)
1304 616161

Malta

VJ Salomone Pharma Ltd. Tel: +
356 21 22 01 74

Reino Unido

Pfizer Limited
Tel: +44 (0) 1304 616161

